

Induscio

Cloprostenol

INJETÁVEL

BOVINOS

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

Cloprostenol sódico 26,30 mg*

Veículo q.s.p. 100 ml

* equivalente a 25 mg de cloprostenol base

INFORMAÇÕES GERAIS:

O **Induscio** é um potente agente luteolítico em fêmeas bovinas, promovendo a luteólise funcional e morfológica quando aplicado no 7º ou no 12º dia após a ovulação.

Como consequência da luteólise, o **Induscio** promove o retorno ao cio e à ovulação normal.

INDICAÇÕES:

O **Induscio** é indicado para o tratamento de anestro causado pela persistência do corpo lúteo e também como sincronizador de cio em fêmeas bovinas em programas reprodutivos como, por exemplo, o IATF (inseminação artificial em tempo fixo).

A ovulação ocorre, geralmente, entre 4 a 6 dias após a aplicação do produto, podendo variar de acordo com a fase do ciclo.

A eficácia do **Induscio** está relacionada com a presença de corpo lúteo funcional em fêmeas que estejam ciclando. O produto pode não surtir efeito antes do 5º dia após o estro e nem após o 16º dia.

O **Induscio** pode ser usado na sincronização do cio de fêmeas bovinas facilitando a implantação de protocolos reprodutivos.

O médico veterinário poderá modificar o esquema de tratamento, de acordo com o manejo reprodutivo adotado.

POSOLOGIA:

Aplicar em fêmeas bovinas 2,0 ml por via intramuscular.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não deve ser administrado em fêmeas prenhes, pois pode induzir o abortamento.

PRECAUÇÕES:

- O manejo deficiente e a má nutrição conduzem a resultados insatisfatórios.
- Recomenda-se uso de luvas de borracha para o manuseio e aplicação do produto.
- Mulheres grávidas, asmáticos e portadores de outras doenças respiratórias não devem manusear esse produto.
- Em caso de dificuldade respiratória devido à inalação, ingestão ou injeção acidental, indica-se o emprego de um broncodilatador de ação rápida por

inalação. Para esta finalidade, por ser usada a isoprenalina ou o salbutamol. Nestes casos, deve-se procurar por cuidados médicos imediatamente.

- Evitar contato direto com a pele e, em casos acidentais, lavar a área afetada com água.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Suspender a medicação quando for detectada reação de sensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

O cloprostenol pode causar aumento da atividade da ocitocina.

APRESENTAÇÕES:

- Encartelado contendo 2 ampolas de 2 ml.
- Caixa individual contendo frasco-ampola com 20 ml.
- Caixa individual contendo frasco-ampola com 50 ml.

O **Induscio** deve ser mantido em sua embalagem original e, após aberto, deverá ser utilizado em um período máximo de 30 dias. O restante do produto não utilizado deve ser descartado após esse período. Não utilizar o produto caso haja sinais de violação do frasco. A exposição direta a luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

“A aplicação deste produto em seres humanos causa grave risco à saúde.”

Conservar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Consulte sempre o Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 10.016/2015 em 26/03/2015.

Resp. Téc. Méd. Vet.:
Dra. Thaís Marino Silva Girio –
CRMV/SP 17.469

Proprietário e Fabricante:
Uzinas Químicas Brasileiras S/A
Praça Dr. Joaquim Batista, 150 –
Jaboticabal – SP
CEP: 14870-090
CNPJ: 50.380.674/0001-37
Indústria Brasileira

SAC 0800-160024