

185 x 70 MM

PRECAUÇÕES:

Agitar bem o frasco antes e durante o uso.

Usar seringas e agulhas estéreis e atender os habituais procedimentos de assepsia. Não vacinar animais estressados, debilitados, doentes ou convalescentes. Não utilizar o produto cujos frascos tenham sido usados no dia anterior.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Poderiam aparecer reações de hipersensibilidade excepcionalmente em alguns animais depois da vacinação; em tais casos tratar em forma imediata com anti-histamínicos. Sugere-se que os animais destinados ao consumo humano não sejam sacrificados até passados os 45 dias da vacinação.

O laboratório não se responsabiliza pelas consequências que surgirem do uso incorreto.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário. Licenciado no Ministério da Agricultura sob o N° 10.412/2021 em 14/06/2021.

Proprietário: LABORATORIOS CHERRY S.A. Juan Benito Blanco 1255 apto 501 - Montevideo - Uruguay - C.P. 11300. Tel/ Fax: (00598)22882111, Responsable Técnico: Dr. Pablo R. Bringas.

Fabricante: LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. Ruta 101 km. 28 - Camino al Paso Escobar s/n Pueblo Capitán J.A. Artigas Canelones - Uruguay - C.P.91.001. Tel.: (00598) 22886761* - Fax: (00598) 22886760. Responsable Técnico: Dr. Pablo Bringas. www.laboratoriosmicrosules.com.

Representante no Brasil, Importador e Distribuidor: LABORATÓRIO CHERRY DO BRASIL LTDA. Av. Bernardino Silveira de Amorim, 1161, S/da 01 - Sarandi, CEP 91140-410 - Porto Alegre - RS - CNPJ: N° 97.213.748/0001-04 Responsable Técnico: Dr. Ruben D. Sosa - CRMV/RS 5911

PRODUTO IMPORTADO. INDÚSTRIA URUGUAIA

**PART.:
FABR.:
VENC.:**

VAC-CHERRY REPRODUTIVA

Vacina para a prevenção da *Rinotraqueíte Infeciosa Bovina (IBR)*, *Diarreia Viral Bovina (BVD)*, *Leptospirose*, *Campilobacteriose (Vibriose)* e *Hemofiose* em bovinos.



USO VETERINÁRIO
Bovinos



CONTEÚDO:
250 mL

COMPOSIÇÃO:

Vacina constituída por uma suspensão inativada dos vírus de *Herpes Bovino* tipo 1 (BHV 1), *Herpes Bovino* tipo 5 (BHV 5), vírus de *Diarreia Viral Bovina* tipo 1 e tipo 2, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. copenhageni*, *L. pomona*, *L. wolffi*, *L. grippityphosa*, *L. tarassovi*, *L. hardjo*, *L. pyrogenes*, *L. hardjo bovis* e *L. bataviae*, *Campylobacter fetus* subespécie *fetus*, *Campylobacter fetus* subespécie *venerealis* e *Campylobacter fetus* subespécie *venerealis* biótipo *intermedius*, e *Haemophilus somnus* com adjuvante oleoso em dupla emulsão.

INDICAÇÕES:

Imunobiológico para a prevenção contra a *Rinotraqueíte Infeciosa Bovina* tipo 1 e 5, *Herpesvírus Bovino-1* (HVBo-1) e *Herpesvírus Bovino-5* (HVBo-5); *Diarreia Viral Bovina* tipo 1 e 2 (vírus da diarreia viral bovina tipo 1 e 2 (BVD-1 e BVD-2)); *Leptospirose* causadas pelas bactérias *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira copenhageni*, *Leptospira pomona*, *Leptospira wolffi*, *Leptospira grippityphosa*, *Leptospira tarassovi*, *Leptospira hardjo*, *Leptospira pyrogenes*, *Leptospira hardjo bovis* e *Leptospira bataviae*; e doenças causadas pelas bactérias *Campylobacter fetus* subespécie *fetus*, *Campylobacter fetus* subespécie *venerealis* e *Campylobacter fetus* subespécie *venerealis* biótipo *intermedius*, e *Haemophilus somnus*.

DOSE E MODO DE USO:

Bovinos: 5 mL. Via subcutânea atendendo os habituais procedimentos de assepsia. Administrar 2 injeções com um intervalo de 20-25 dias. Posteriormente se realizará uma dose de reforço anual. Bovinos podem ser vacinados a partir dos 3 meses de idade. Pode ser usado em fêmeas prenhes.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Conservar a temperatura entre 2 e 8°C. NÃO CONGELAR. É aconselhável manter o produto em lugares longe da ação dos raios solares.

**VAC-CHERRY
REPRODUTIVA**

